

In questo numero:

In questa edizione redatta dal NCSO per Settembre 2018 riportiamo con piacere il link alle principali pubblicazioni in tema di terapie di supporto al paziente Oncologico.

Rassegna stampa e news dal network

Nel corso degli ultimi due mesi sono state pubblicate da ESMO (European Society of Medical Oncology) le linee guida ufficiali in tema di terapie di supporto che hanno visto l'importante contributo di molti membri della nostra associazione, più in particolare:

#### **Diarrhoea in adult cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines.**

Bossi P, Antonuzzo A, Cherny NI, Rosengarten O, Pernot S, Trippa F, Schuler U, Snegovoy A, Jordan K, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol. 2018 Jun 21.

*Le linee guida ESMO per la gestione clinica della diarrea nei pazienti oncologici adulti rappresenta una delle più complete linee guida per quanto riguarda la diagnosi, l'individuazione della causa (chemioterapia, agenti biologici, immunoterapia, chirurgia, radioterapia) e le modalità di gestione.*

*Uno specifico focus è dedicato ad altre cause di diarrea nei pazienti oncologici (infezione da Clostridium difficile, alimentazione enterale, blocco del plesso celiaco e diarrea dovuta a procedure chirurgiche); sono inoltre forniti i modelli clinici di enterocolite neutropenica e non neutropenica come potenziale complicanza acuta potenzialmente letale. Sono stati inoltre affrontati particolari setting di cura, come il paziente anziano. Le linee guida valutano anche l'importanza di una classificazione accurata dei sintomi della diarrea, dell'utilizzo dei PROs e del sistema CTCAE per una più chiara e corretta rilevazione non solo dei sintomi ma anche della loro entità.*

#### **Delirium in adult cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines.**

Bush SH, Lawlor PG, Ryan K, Centeno C, Lucchesi M, Kanji S, Siddiqi N, Morandi A, Davis DHJ, Laurent M, Schofield N, Barallat E, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol. 2018 Jul 10.

*Le Linee Guida ESMO 2018 per la gestione del Delirio nei pazienti oncologici adulti prendono in esame tutte le evidenze riportate in letteratura nel corso degli ultimi anni. Gli autori pongono l'accento sull'importanza di una pronta diagnosi di delirio, dell'individuazione precoce delle cause precipitanti e delle modalità di gestione. La gestione sintomatica del delirio dovrebbe concentrarsi principalmente su strategie gestionali non farmacologiche e sul supporto psicologico dei pazienti e delle famiglie. L'uso di antipsicotici e delle benzodiazepine deve essere ridotto al minimo e valutato in maniera appropriata al fallimento degli interventi non farmacologici.*

#### **Diagnosis, assessment and management of constipation in advanced cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines.**

Larkin PJ, Cherny NI, La Carpià D, Guglielmo M, Ostgathe C, Scotté F, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol. 2018 Jul 17.

*La stipsi è un problema molto frequente in oncologia in tutti i setting di trattamento e rappresenta una fonte significativa di gravi morbilità nonché distress per il paziente. Le linee guida ESMO 2018 analizzano diagnosi, assessment e trattamento della stipsi seguendo tutte le evidenze disponibili in letteratura e del più alto livello.*

In questo numero:

In questa edizione redatta dal NCSO per Settembre 2018 riportiamo con piacere il link alle principali pubblicazioni in tema di terapie di supporto al paziente Oncologico.

Rassegna stampa e news dal network

*Focus particolare sulla gestione della stipsi indotta dai farmaci oppioidi e sull'utilizzo delle nuove terapie "targeted" per questa sintomatologia disponibili sul mercato, più in particolare dei PAMORAS ma anche una corretta strategia di management generale ritagliata sulle specifiche condizioni del paziente.*

## **Management of cancer pain in adult patients: ESMO**

### **Clinical Practice Guidelines.**

Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol. 2018 Jul 24.

*L'importante lavoro di analisi della letteratura disponibile da parte degli autori ha portato alla revisione della versione precedente, con importanti aggiornamenti in merito alle evidenze su tutti gli argomenti trattati, con un focus importante sull'efficacia degli oppioidi forti a basse dosi e il cosiddetto salto del II step della scala analgesica WHO, l'utilizzo della Ketamina nella gestione del dolore oncologico e dei cannabinoidi sintetici.*



**MASCC™**

Multinational Association of Supportive Care in Cancer  
*Supportive Care Makes Excellent Cancer Care Possible*

**January-December 2018**

MASCC has partnered with the  
 NICSO to offer joint membership  
 options



**MASCC™**

Multinational Association of Supportive Care in Cancer  
*Supportive Care Makes Excellent Cancer Care Possible*

Ordinary Fee\*

\$ 75,00  
**\$ 50,00**

Ordinary Fee\*  
 (trainee/student)

\$ 50,00  
**\$ 35,00**



Ordinary Fee

€ 50,00  
**€ 35,00**

Ordinary Fee  
 (under 35 yo/  
 nurses)

€ 30,00  
**€ 15,00**

\*: membership with online  
 journal (Supportive Care in  
 Cancer)

First 30 new memberships for NICSO (under 35 yo):  
 Free MASCC subscription (paid by NICSO)