

In questo numero:

In questa edizione redatta dal NCSO per Ottobre-Novembre 2018 riportiamo con piacere il link alle principali pubblicazioni in tema di terapie di supporto al paziente Oncologico.

Rassegna stampa e news dal network

Questo mese affronteremo nuovamente la gestione della diarrea nei pazienti in trattamento con farmaci inibitori delle tirosin chinasi (TKIs), affrontando potenziali cause prevenibili e trattabili di questo fenomeno:

Treatable causes of diarrhoea in patients on tyrosine kinase inhibitors for metastatic renal cell carcinoma. S V Lightowers, B Greef, T Eisen, A Matakidou, K Fife, E A Cameron; *Annals of Oncology*;

<https://doi.org/10.1093/annonc/mdy469>

La gestione delle tossicità durante il trattamento a lungo termine con TKIs è importante sia per mantenere l'intensità e la durata del trattamento, sia per preservare il benessere e la qualità di vita del paziente. L'esperienza riportata in questa recente pubblicazione sulla rivista *Annals of Oncology* è l'esempio di un corretto approccio metodico-analitico su tutte le potenziali cause di diarrea in pazienti che assumevano TKIs afferenti in unità di diagnostica gastroenterologica per disturbi potenzialmente TKI-correlati.

Una più corretta analisi ha mostrato come il 70% dei pazienti afferenti manifestava cause secondarie di diarrea non direttamente riconducibili al trattamento attivo e pertanto potenzialmente risolvibili senza necessità di drug-discontinuation.

Tra le cause più comune indirettamente collegate al farmaco e quindi correggibili sono state individuate l'insufficienza esocrina pancreatica (bassi livelli di elastasi fecale o un risultato borderline con storia compatibile e risposta all'integrazione con enzimi pancreatici), un'alterata proliferazione batterica nell'intestino tenue (diagnosticata con il breath test all'idrogeno e migliorati in seguito a terapia antibiotica), e il malassorbimento di acido biliari

diagnosticati con la metodica del *selenium homocholic acid taurine (SeHCAT) scan* e risolta nella maggior parte dei casi con trattamenti a base di agenti sequestranti dei sali biliari come colestiramina o con alcune modifiche del piano alimentare.

Questo rappresenta uno degli esempi più concreti di multidisciplinarietà in ambito oncologico. Siamo sicuri ed è importante con l'avvento delle terapie immunologiche combinate con i TKI che sia fondamentale un simile approccio sistematico alla gestione della diarrea.

Ricordiamo che per ulteriori approfondimenti riguardo la tematica affrontata sono disponibili on line le nuove linee guida ufficiali pubblicate dall' ESMO (*European Society of Medical Oncology*) di cui vi riproponiamo il collegamento ipertestuale:

[Diarrhoea in adult cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines.](#)

Bossi P, Antonuzzo A, Cherny NI, Rosengarten O, Pernot S, Trippa F, Schuler U, Snegovoy A, Jordan K, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. *Ann Oncol.* 2018 Jun 21.

Le linee guida ESMO per la gestione clinica della diarrea nei pazienti oncologici adulti rappresenta una delle più complete linee guida per quanto riguarda la diagnosi, l'individuazione della causa (chemioterapia, agenti biologici, immunoterapia, chirurgia, radioterapia) e le modalità di gestione.

*Uno specifico focus è dedicato ad altre cause di diarrea nei pazienti oncologici (infezione da *Clostridium difficile*, alimentazione enterale, blocco del plesso celiaco e diarrea dovuta a procedure chirurgiche); sono inoltre forniti i modelli clinici di enterocolite neutropenica e non neutropenica come potenziale complicanza acuta*

In questo numero:

In questa edizione redatta dal NCSO per Ottobre-Novembre 2018 riportiamo con piacere il link alle principali pubblicazioni in tema di terapie di supporto al paziente Oncologico.

Rassegna stampa e news dal network

potenzialmente letale. Sono stati inoltre affrontati particolari setting di cura, come il paziente anziano. Le linee guida valutano anche l'importanza di una classificazione accurata dei sintomi della diarrea, dell'utilizzo dei PROs e del sistema CTCAE per una più chiara e corretta rilevazione non solo dei sintomi ma anche della loro entità.

Il NCSO vi da appuntamento a novembre con molte importanti novità ed augura a tutti una buona lettura e un buon lavoro, sempre al fianco dei Nostri pazienti.



MASCC™

Multinational Association of Supportive Care in Cancer
Supportive Care Makes Excellent Cancer Care Possible

January-December 2018

MASCC has partnered with the
 NICSO to offer joint membership
 options



MASCC™

Multinational Association of Supportive Care in Cancer
Supportive Care Makes Excellent Cancer Care Possible

Ordinary Fee*

\$ 75,00
\$ 50,00

Ordinary Fee*
 (trainee/student)

\$ 50,00
\$ 35,00



Ordinary Fee

€ 50,00
€ 35,00

Ordinary Fee
 (under 35 yo/
 nurses)

€ 30,00
€ 15,00

*: membership with online
 journal (Supportive Care in
 Cancer)

First 30 new memberships for NICSO (under 35 yo):
 Free MASCC subscription (paid by NICSO)